Vol. 10 Número 02 - 2015

Unión de Ornitólogos del Perú

UNOP

Boletín

https://sites.google.com/site/boletinunop/

Donacobius atricapilla
Foto: Antonio García-Bravo

INDICE

NOTAS CORTAS

Mariamercedes Antezana A. (2015). Primer registro de *Molothrus oryzivorus* para la costa central del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10 (2): 6-8.

Antonio García-Bravo, David Rosario B., Jorge Tiravanti C., Karlom Herrera-Peralta & Richard Díaz. (2015). Registros de *Donacobius atricapilla* en los Bosques Secos del Marañón, Amazonas y Cajamarca, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10 (2): 9-13.

Javier Barrio & Diego García-Olaechea. (2015). New records for the feeding niche for the White-cheeked Cotinga (*Zaratornis stresemanni*) in the high Andes. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 14-16.

Cesar Ortiz Z. (2015). Reporte de un evento de depredación y alimentación de un Halcón Aplomado (*Falco femoralis*) en la ciudad de Arequipa, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 17-18.

José Luis Avendaño M. (2015). Primer registro del Loro de Frente Turquesa (*Amazona aestiva*) para el Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 19-21.

Jhonson K. Vizcarra. (2015). Caso de leucismo parcial en la Gallareta Andina (*Fulica ardesiaca*) en los Humedales de Ite, sur del Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 22-25.

ARTÍCULOS

José L. Venero G. (2015). Aves de la Laguna de Huaypo, Cusco, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10 (2): 26-30.

Frank E. Suárez P. & Alexander More. (2015). Registros la Bandurria de Cara Negra (*Theristicus melanopis*) en las lagunas Ñapique y La Niña, Sechura, Piura. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 31-36.

Christian Devenish, Emil Rivas, Alexander More & Diego García-Olaechea. (2015). Uso de hábitat atípico y ampliación de área de distribución de *Cyanocompsa cyanoides* en el Bosque Seco de Talara, Piura, Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 37-42.

Anthony Vásquez Najarro. (2015). Identificación de un dormidero comunal y censo de Cóndores Andinos (*Vultur gryphus*) en la Reserva Nacional San Fernando. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 43-53.

OTROS

Manuel A. Plenge. Bibliografía de las Aves del Perú 2015. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 54-62.

Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) (2015). Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas del periodo 2014 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2014. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 10(2): 63-71.

Reporte del Comité de Registros de Aves Peruanas (CRAP) del periodo 2014 / Report of the Peruvian Bird Records Committee 2014

Miembros del comité / Committee members: Fernando Angulo, Daniel F. Lane, Manuel Plenge, Thomas Schulenberg, Douglas Stotz, Mauricio Ugarte, Thomas Valqui, Barry Walker, Renzo Zeppilli

Comité de Registros de Aves Peruanas / Peruvian Bird Records Committee

En este reporte publicamos los resultados de los cinco casos tratados en el año 2014. Nuestro reporte organiza los casos en tres secciones: casos aceptados, casos rechazados y los casos donde existe un cambio en el estatus de la especie. Al interior de estas secciones, las especies están ordenadas taxonómicamente. Para cada caso aceptado se incluye el nombre del observador, el lugar y la fecha de la observación. Además se indica si el registro fue publicado anteriormente y si existió evidencia del registro. Asimismo, se indica el status de la especie para el Perú. Para casos que no han sido aceptados, incluimos las características básicas del reporte (sin especificar el observador) y nuestras razones para no aceptarlo. Finalmente, se muestra la votación de los miembros dividida en votos a favor (Sí), en contra (No) y las abstenciones.

Para reportar especies que son registradas por primera vez en el Perú, se debe escribir al secretario del CRAP (Daniel Lane, barbetboy@yahoo.com) y solicitar el "Formulario para el Registro de Observaciones de Aves Raras en Perú". Luego se le debe enviar el formulario de regreso correctamente llenado. Las especies que tienen prioridad de ser reportadas al CRAP son aquellas señaladas en la "Lista de las Aves de Perú" con una (H) de "hipotéticas" (Plenge 2015), la cual está disponible en la página web de la Unión de Ornitólogos del Perú: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist o por supuesto, aquellas especies que no estén en esta lista. Más información sobre el CRAP puede ser revisada en la web del CRAP: http:// www.corbidi.org/CRAP.html

En el año 2014, la composición del comité cambió con la salida de Huw Lloyd y John O'Neill, a quienes agradecemos por sus contribuciones. El comité cuenta entonces con nueve miembros. Los casos que tengan cinco votos —ya sean estos Sí, No o Abstenciones— son considerados como decisión final.

In this report, we publish the results of the five cases received by CRAP in 2014. Our report organizes the cases in three sections: records accepted, records not accepted, and species with status change. Within these sections, species are arranged taxonomically. For accepted cases, we include the name of the observer, the location and date of the observation, an indication of whether the record was previously published, and the nature of the documentation for the record. We also indicate the status of the species for Peru. For cases that were not accepted, we provide the basic circumstances of the report (but do not specify the observers who reported the record) and our reasons

of PBRC (Daniel Lane, barbetboy@yahoo.com) requesting the "Record Form for Rare Bird Observations in Peru", this should be completed and returned to the secretary. The priority species to be reported to the PBRC are those identified with an (H) of "hypothetical" in the "List of the Birds of Peru" (Plenge 2015), which is available on the website of the Peruvian Ornithologists Union: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist and, of course, species not on that list. More information on the PBRC can be obtained on its website: http://www.corbidi.org/CRAP.html

In 2014, the makeup of the committee changed, with the leaving of Huw Lloyd and John O'Neill, who we thank for their contributions. The committee therefore dropped to 9 members. Thus cases with votes of 5 Yes or No/Abstain votes pass with that as the final decision.

Casos aceptados / Records accepted

Caso 2014-001: *Fluvicola pica*; Tirano-de-Agua Blanco y Negro; Pied Water-Tyrant

Desde la división taxonómica de *Fluvicola pica* y *F. albiventris*, se asumió que solo esta última estaba presente regularmente en Perú, como un migrante austral no reproductivo (Schulenberg *et al.* 2010). El primero era relativamente desconocido para la Amazonia occidental hasta que se publicó recientemente un reporte de este como divagante en la Amazonia ecuatoriana, en base a un registro sin confirmar de enero de 2000 y un registro documentado de enero de 2007. Un registro adicional de julio de 1974 fue considerado imposible de identificar a nivel de especie (Freile *et al*. 2013).

Entre el 03 y el 07 de diciembre de 2009, Andrew Spencer, Christian Nunes e Ian Davies observaron y fotografiaron (Fig. 1 & 2) seis o más individuos a lo largo del río Ucayali entre Yarinacocha, en el departamento de Ucayali y el norte de Contamana, en el departamento de Loreto. Las fotos muestran claramente las escapulares blancas que distinguen a *F. pica* de *F. albiventris*; y las fechas del avistamiento se ajustan a un patrón de migración boreal y no austral.

Figura 1 & 2 : *Fluvicola pica*; Tirano de agua blanco y negro; Pied Water-Tyrant. Fotos: Christian Nunes.

Los individuos fueron observados en matorrales ribereños bajos e inundados a lo largo del río Ucayali. Este reporte del avistamiento de múltiples individuos sugiere una pequeña invasión de la Amazonía occidental durante la estación seca en el área de reproducción de la especie en los Llanos de Venezuela y Colombia. Aunque estamos considerando a la especie como divagante, en base a este reporte, parece ser probable que la especie sea un visitante no reproductivo irregular del Perú durante estaciones secas extremas en su área de distribución usual. Sin embargo, anteriormente pudo no ser detectado correctamente, debido a su similitud con *F. albiventris*; o simplemente por falta de observadores durante los meses de noviembre a febrero, periodo en el cual, *F. picus* es la especie que tendría mayor probabilidad de estar presente en el norte y centro de la Amazonía peruana.

La inclusión de esta especie como divagante en la lista de aves de Perú fue aprobada con siete votos a favor y dos abstenciones.

Since the taxonomic split of Pied Water-Tyrant (*Fluvicola pica*) and Black-backed Water-Tyrant (*F. albiventris*), it was assumed that only the latter was regularly present in Peru, present as nonbreeding Austral migrant (Schulenberg *et al.* 2010). *F. pica* was relatively unknown from western Amazonia until it was recently published as a vagrant in Amazonian Ecuador based on an unconfirmed record from January 2000 and a documented record from January 2007; an additional record from July 1974 was considered unidentifiable to species (Freile *et al.* 2013).

Between 3 and 7 December 2009, Andrew Spencer, Christian Nunes, and Ian Davies observed and photographed 6 or more individuals (Fig. 1 & 2) along the Río Ucayali between Yarinacocha, Ucayali dept., and just north of Contamana, Loreto dept. The photos clearly show the bold white scapulars that distinguish *F. pica* from *F. albiventris*, and the dates fit a boreal, but not an austral, migrant pattern. The birds were observed in short, flooded riverine scrub along the Ucayali. This report of multiple individuals suggests a small invasion of western Amazonia during the dry season in the breeding range of the species in the Llanos of Venezuela and Colombia. Although we presently consider the species a vagrant based on this report, a pattern may show it to be an irregular non-breeding visitor to Peru during extreme dry seasons in its usual distribution. If this is true, the species may have gone undetected due to similarity to *F. albiventris*, or simply lack of observers during the months of November-February, when *F. picus* would be most expected in the northern and central Peruvian Amazon.

The votes were: 7 Yes and 2 abstentions. The species was accepted to the Peruvian list as a Vagrant.

Caso 2014-002: *Hemitriccus cohnhafti*; Tirano-Todi de Acre; Acre Tody-Tyrant

Esta especie ha sido descrita para la ciencia recientemente (Zimmer *et al*. 2013) y era conocida en una sola localidad en el estado de Acre, Brasil, a unos pocos kilómetros de la frontera con Perú. Entre el 16 y 20 de noviembre de 2011 (antes de la publicación de la descripción), un pequeño grupo liderado por miembros del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad del Estado de Luisiana, encontró un *Hemitriccus* desconocido cerca de Portillo (11°27'S / 69°30'36"O, 300 m), en el departamento de Madre de Dios, al oeste de la Carretera Interoceánica Sur.

Se pudo obtener fotos (Fig. 3), videos, grabaciones de cantos y especímenes de museo (Fig. 4). Los miembros del grupo

fueron alertados sobre la especie no descrita, la cual, Zimmer *et al.* estaban describiendo y se comunicaron con el equipo de autores para confirmar si el ave de Portillo era la misma. Zimmer *et al.* confirmaron que sí era. La presencia de la población de Portillo fue publicada en Harvey *et al.* (2014). Con ello, *Hemitriccus cohnhafti* es incorporada a la avifauna peruana como un residente reproductivo regular.

Figura 3: *Hemitriccus cohnhafti;* Tirano-todi de Acre; Acre Tody-Tyrant. Foto: Justin Hite.

Figura 4: *Hemitriccus cohnhafti;* Tirano-todi de Acre; Acre Tody-Tyrant. Foto: Daniel Lane.

La inclusión de esta especie como un residente reproductivo en la lista de aves de Perú fue aprobada con seis votos a favor y tres abstenciones.

This species was only described to science recently (Zimmer *et al.* 2013) and known from a single locality in Acre state, Brazil, only a few km from the Peruvian border. Between 16 and 20 November 2011(before the publication of the description), a small group, led by Louisiana State University Museum of Natural Science members, encountered an unknown *Hemitriccus* near Portillo (11°27'S / 69°30'36"O, 300 m), Madre de Dios dept, just west of the Interoceanic Highway, obtaining photos (Fig. 3), video, sound recordings, and museum specimens (Fig. 4). They were alerted to the undescribed species Zimmer *et al.* were describing and communicated with that author team to confirm that the Portillo bird was the same. Zimmer *et al*. agreed it was, and the Portillo population was published by Harvey *et al.* (2014). *Hemitriccus cohnhafti* is added to the Peruvian avifauna as a regular breeding resident.

The votes were: 6 Yes, 3 Abstentions. The species is accepted onto the Peruvian list as Breeding Resident.

Casos no aceptados / Records not accepted

Caso 2014-003: *Athene cunicularia boliviana;* Lechuza Terrestre; Burrowing Owl (subsp. *boliviana*)

Este registro es interesante, ya que es el primer caso para CRAP en el cual se ha revisado la presencia de una subespecie no reportada para el Perú de una especie que sí está registrada. Como tal, este caso ha generado una interesante discusión entre los miembros del comité. *Athene* [*Speotyto*] *cunicularia* se ha convertido en una especie reproductora en la Amazonia baja del Perú en los últimos 15 años; y ahora está presente desde el norte de Loreto hasta

Madre de Dios por el sur. CRAP recibió un reporte de varias observaciones hechas en los departamentos de Cusco y Madre de Dios que identifican a los individuos como de la subespecie boliviana. En el reporte, el observador dio el nombre de *boliviana* debido a la suposición de que estos no eran de ninguna de las otras subespecies que había en Perú. Por otra parte, el observador informó que *A. c. boliviana* había sido reportada en los departamentos de Beni y Santa Cruz, en Bolivia y que por lo tanto, debe ser el taxón en Madre de Dios.

Todos los miembros de CRAP que han comentado sobre el presente caso, están de acuerdo en que las poblaciones amazónicas peruanas de *A. cunicularia* no pertenecen a ninguno de los taxones de los Andes o de la costa del Pacífico (que son *A. c. punensis*, *A. c. intermedia*, *A. c. nanodes* y *A. c. juninensis*) y que existen otros taxones en las tierras bajas de la Amazonia cis-Andinas de América del Sur que deben ser descartados antes de utilizar el nombre "*boliviana*" para los individuos de la Amazonia peruana.

En primer lugar, ¿cómo se define el taxón "*boliviana*" en su descripción y dónde está la localidad tipo y cuál es su distribución global? Para eso, es necesario revisar la descripción que se tenga a la mano. Afortunadamente, Manuel Plenge fue capaz de encontrar dicha descripción (Kelso 1939) y compartirla con el resto del comité. El taxón fue descrito en base a un espécimen de Steinbach que era parte de la colección personal de Kelso (la ubicación actual de la colección Kelso y de este espécimen tipo en particular requeriría de una nueva investigación) y que fue colectado en Warnes, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia (una ciudad ubicada en las tierras bajas de la Chiquitanía, aproximadamente a 30 km al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a una altitud aproximada de 400 m).

Ese es el nombre que se les aplica a los individuos de las tierras bajas del este y presumiblemente, el norte de Bolivia. Los caracteres que Kelso utilizó para definir *boliviana* son: ala más corta y dedos con menor densidad de cerdas que *A. c. juninensis* (de los Andes) y ala más larga y dedos más escasamente emplumados que *A. c. cunicularia*. Lamentablemente, Kelso no especificó cómo midió la longitud del ala (cuerda alar o ala plana), no cuantificó la diferencia que había entre las mediciones del ala de *boliviana* y los otros dos taxones que menciona o cuál fue el rango de variación entre las mediciones del ala de los seis paratipos. Él, sin embargo, afirma que "cuatro ejemplares de Mendoza, Argentina, son intermedios entre [*boliviana*] y *cunicularia"*, sin explicar cómo fue determinado este aspecto.

A partir de la descripción que Kelso, se determinó que poder contar con un espécimen colectado sería importante para determinar si un individuo es de este taxón. Sin embargo, otros taxones cis-andinos serían necesarios para ser descartados, tales como: *minor* (del escudo de Guiana, localidad tipo: Boa Vista, Brasil), *brachyptera* (de los Llanos de Colombia y de la parte adyacente de Venezuela, localidad tipo: Isla Margarita, Venezuela, incluyendo subespecies *apurensis*, según Poulin *et al*. 2011), *grallaria* (este y centro de Brasil; localidad tipo: Sao Paolo, Brasil) y *cunicularia* (tierras bajas al oeste de los Andes en Chile y al este de los Andes del norte de Argentina y sur de Brasil hasta Tierra del Fuego por el sur; localidad tipo: Chile).

Una reevaluación actual de los taxa que componen *A. cunicularia* hubiese sido útil para determinar qué nombres son válidos y para tal vez poder determinar qué poblaciones podrían haber invadido la Amazonía del Perú. Es probable que los individuos del norte de la Amazonía

peruana pertenecen a las poblaciones de los Llanos y que los individuos del sur de la Amazonía peruana provengan de las poblaciones de Bolivia, pero no existen evidencias concretas. Estas suposiciones son infundadas. Por lo tanto, CRAP ha decidido no votar sobre qué taxón está presente en la Amazonía del Perú y espera contar con una identificación basada en un espécimen.

La subespecie no fue admitida en la lista de aves de Perú con seis votos en contra y tres abstenciones.

The present record is an interesting one, as it is the first CRAP has reviewed of an extralimital subspecies of a species already occurring in Peru! As such, it has brought up some interesting discussion among the committee members.

Burrowing Owl (*Athene* [*Speotyto*] *cunicularia*) has become a breeding species in the Amazonian Lowlands of Peru over the past 15+ years, and is now present from northern Loreto south to Madre de Dios. CRAP received a report of various sightings from Cusco and Madre de Dios departments identifying birds there as subspecies *boliviana*. In the report, the observer named these birds *boliviana* because of the assumption that they were not any of the taxa already reported from Peru. Furthermore, the observer reported, *A. c. boliviana* has been reported from Beni and Santa Cruz departments of Bolivia, and thus must be the taxon in Madre de Dios. Whereas all members of CRAP to have commented agree that the Peruvian Amazonian populations of *A. cunicularia* are not any of the taxa from the Andes or Pacific coast of the country (which are *A. c. punensis, A. c. intermedia, A. c. nanodes*, and *A. c. juninensis*), there are other taxa in the cis-Andean lowlands of South America that need to be eliminated from consideration before we feel comfortable in applying the name "*boliviana*" to Peruvian birds.

First, how is the taxon "*boliviana*" defined in its description, and where is the type locality and overall distribution? For that, we must find the description and review it. Thankfully, Manuel Plenge was able to find this otherwise very obscure description (Kelso 1939) and provided it to the rest of the committee. The taxon is named from a Steinbach specimen that was part of Kelso's personal collection (we did not research the present day location of the Kelso collection and this particular type), and was collected in Warnes, Santa Cruz dept., Bolivia (a town in the *Chiquitano* lowlands about 30 km north of the city of Santa Cruz de la Sierra and at an elevation of about 400 m). So we can conclude the name is correctly applied to birds of the lowlands of eastern, and presumably northern, Bolivia. The characters Kelso used to define *boliviana* are: a shorter wing and more sparsely bristled toes than Andean *A. c. juninensis*, and a longer wing and more sparsely feathered toes than *A. c. cunicularia*. Disappointingly, Kelso did not specify how he measured the wing length (wing chord or flat wing?), how much difference there was between the wing measurements of *boliviana* and the two other taxa he mentioned, or what the range of variation was among the wing measurements of the six paratypes. He did state that "four specimens from Mendoza, Argentina, are somewhat intermediate to [*boliviana*] and *cunicularia*," but did not explain how this was determined.

From Kelso's description, it seems that having a specimen in the hand would be important in order to determine if a bird were of this taxon. However, other cis-Andean taxa would also need to be eliminated: *minor* (from the Guianan shield; type locality Boa Vista, Brazil), *brachyptera* (from the Llanos of Colombia and nearby Venezuela; type locality Isla Margarita, Venezuela, including subspecies *apurensis*,

following Poulin *et al.* 2011), *grallaria* (eastern and central Brazil; type locality Sao Paolo, Brazil), and nominate *cunicularia* (lowlands west of Andes in Chile and east of Andes from northern Argentina and southern Brazil south to Tierra del Fuego; type locality "Chile"). A modern reassessment of the taxa composing *A. cunicularia* would be useful to see what names are valid, and perhaps which source populations have invaded Amazonian Peru. It seems likely that birds from the northern Peruvian Amazon are from the Llanos populations, and birds in southern Amazonian Peru from Bolivian populations, but without evidence these assumptions are unfounded. For now, CRAP has decided not to vote on what taxon is involved in Amazonian Peru, and instead await specimen-based identification.

Votes were: 6 No, 3 Abstentions. The taxon was not admitted to the Peruvian list.

Caso 2014-004: *Procellaria westlandica*; Petrel de Westland; Westland Petrel

De los tres petreles del genero Procellaria que son oscuros, solo *P. aquinoctialis* y *P. parkinsoni* han sido documentados de manera concluyente en aguas peruanas. *P. westlandica* ha recibido el estatus de "Hipotético" en la lista del Perú, por contar solo con reportes indocumentados hasta la fecha. El 25 de setiembre de 2010, observadores en un viaje pelágico desde El Callao fotografiaron un petrel oscuro del género *Procellaria* con la punta del pico oscura (Fig. 5), entre varios *P. aquinoctialis* en las siguientes coordenadas: 12°14'2.40"S / 77°40'38.64"O.

Los observadores que la reportaron identificaron este ave como *P. westlandica*, pero, además del color de la punta del pico, no proporcionaron detalles que apoyasen su identificación. Desafortunadamente, *P. parkinsoni* también es una posibilidad en cuanto a la identificación del individuo y este no fue mencionado en el reporte. Además, CRAP le solicitó a dos expertos comentarios sobre la documentación de las aves avistadas y recibió identificaciones diferentes. Este aparente desacuerdo y lo que se pudo determinar a través de las fotos no son concluyentes. Por eso, a falta de detalles y pruebas que apoyen lo planteado, no se aceptó el registro como *P. westlandica*, aunque CRAP reconoce que el ave en mención se trataba de *P. westlandica* o de *P. parkinsoni.*

Figura 5: *Procellaria sp.*; Petrel sp. Foto: Niall Perrins.

El estatus de esta especie permanece como Hipotética en la lista de aves de Perú y este cambio no fue aceptado con cuatro votos en contra y cinco abstenciones.

Of the three dark *Procellaria* petrels, only White-chinned, *P. aquinoctialis*, and Parkinson's (or Black), *P. parkinsoni*, have been conclusively documented within Peruvian waters. Westland Petrel, *P. westlandica*, has received "hypothetical" status on the Peruvian list with only undocumented reports to date. On 25 September 2010, observers on a pelagic trip out of Callao photographed a dark *Procellaria* petrel with a dark bill tip (Fig. 5) among several *P. aquinoctialis* at a lat/long of 12°14'2.40"S / 77°40'38.64"O.

The reporting observers identified this bird as *P. westlandica*, but, aside from bill tip color, did not provide details supporting their identification. Unfortunately, *P. parkinsoni*, is also a possibility, but was not mentioned in the report. CRAP requested outside reviews of the documentation from two tubenose experts and received conflicting identifications. This apparent disagreement, in conjunction with what were determined to be inconclusive photos and lack of supporting details submitted, resulted in the rejection of the record as *P. westlandica*, although CRAP recognizes that the bird was either *P. westlandica* or *P. parkinsoni*.

Votes were: 4 No, 5 Abstentions. The species' status on the Peruvian list remains hypothetical.

Especies con cambio de status / species with status change:

Caso 2014-005: *Mimus triurus*; Calandria de Ala Blanca; White-banded Mockingbird

El 05 de agosto de 2014, a las 16:37, Jesús Cieza Ponce y Omar Díaz Villalobos observaron, fotografiaron (Fig. 6) y filmaron un individuo de *Mimus triurus* (video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=tIXX8GkLxVE&feature=youtu.be) en El Triunfo, a las afueras de la ciudad de Puerto Maldonado, en la orilla norte del río Madre de Dios (12°35'29.77"S / 69°09'47.47"O, 180 m), en el departamento de Madre de Dios. Este registro fue publicado en el Boletín UNOP (Cieza & Díaz 2014).

El individuo fue encontrado posado en el suelo y luego en un arbusto bajo, cerca de una pequeña laguna estacional en un área deforestada con árboles dispersos. Este es el primer registro documentado de *M. triurus* en Perú y confirma su presencia en el país. Existía anteriormente un único registro previo, sin documentar, hecho en la isla Taquile, en el Lago Titicaca (15°45'49.39"S / 69°40'58.11"O, 3840m) en el departamento de Puno, el 20 de diciembre de 2001 (Shardlow & Shardlow 2004). Sin embargo, la descripción del individuo de la isla Taquile no excluye a la Calandria Castaña (*M. dorsalis*), una especie que ha sido confirmada como divagante para el Perú (Venero & Vergara 2013). Como se sabe que *M. triurus* migra hacia el norte llegando hasta el norte de Bolivia en esa época del año, su presencia en el Perú era de esperarse.

Figura 6: *Mimus triurus;* Calandria de Ala Blanca; White-banded Mockingbird. Foto: Omar Diaz.

La inclusión de esta especie en la lista de aves de Perú fue aprobada con siete votos a favor y dos abstenciones cambiando de hipotético a divagante.

On 5 August 2014, Jesus Ponce Cieza Villalobos and Omar Diaz observed, photographed (Fig. 6), and filmed an individual of White-banded Mockingbird (video available at https://www.youtube.com/watch?v=tIXX8GkLxVE&feature=youtu.be) in El Triunfo, just outside the city of Puerto Maldonado, on the north bank of the Madre de Dios River (12°35'29.77" S, 69°09'47.47" W, 180 m), in Madre de Dios dept. This

record was published in the Boletin UNOP (Cieza & Diaz 2014).

The observers spotted the bird perched on the ground and later on a low bush near a small seasonal pond in a deforested area with scattered trees. This is the first documented record of *M. triurus* in Peru and confirms its presence in the country. There was only one previous undocumented record made in Taquile Island in Lake Titicaca (15°45'49.39"S / 69°40'58.11"W, 3840 m), Puno dept., on 20 December 2001 (Shardlow & Shardlow 2004), but the description of the Taquile Island bird did not rule out Brown-backed Mockingbird (*M. dorsalis*), a species since confirmed as a vagrant to Peru (Venero & Vergara 2013). Since *M. triurus* migrates as far north as northern Bolivia at this time of year, its presence in Peru was expected.

Votes were: 7 Yes, 2 abstentions. The species' status on the Peruvian list has been changed from hypothetical to Vagrant.

Literatura citada / Literature cited

Cieza P. J., & O. Díaz V. 2014. Primer registro documentado del Calandria de Ala Blanca (*Mimus triurus*) en Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP) 9: 49-51.

Freile, J. F., R. Ahlman, D. M. Brinkhuizen, P. J. Greenfield, A. Solano-Ugalde, L. Navarrete, & R. S. Ridgely. 2013. Rare birds in Ecuador: first annual report of the Committee of Ecuadorian Ornithology (CERO). Avances en Ciencias e Ingenierías 5B: 24-41.

Harvey, M. G., D. F. Lane, J. Hite, R. S. Terrill, S. Figueroa R., B. R. Smith, J. Klicka, & W. Vargas C. 2014. Notes on bird species in bamboo in northern Madre de Dios, Peru, including the first Peruvian record of Acre Tody-Tyrant (*Hemitriccus cohnhafti*). Occasional Papers of the Museum of Natural Science, Louisiana State University 81: 1-38.

Kelso, L. 1939. Additional race of American owls. Biological Leaflet 11: 1-2.

Plenge, M. A. Version 2015. List of the Birds of Peru. Lima, Perú. Available at: https://sites.google.com/site/boletinunop/checklist

Poulin, R., L. D. Todd, E. A. Haug, B. A. Millsap, & M. S. Martell. 2011. Burrowing owl (*Athene cunicularia*). The Birds of North America Online (A. Poole, Ed.). Ithaca: Cornell Lab of Ornithology.

Schulenberg, T. S., D. F. Stotz, D. F. Lane, J. P. O'neill, and T. A. Parker, III. 2010. Birds of Peru: Revised edition. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Shardlow, M.E.A. & H. M. Shardlow. 2004. First record of White-banded Mockingbird *Mimus triurus* for Peru and a summary of known occurrence. Cotinga 21: 79-80.

Venero G., J. L. & M. Vergara. 2013. Primer reporte de la Calandria Castaña (*Mimus dorsalis*) para el Perú. Boletín de la Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP), 8 (2): 14-15.

Zimmer, K. J., A. Whittaker, C. H. Sardelli, E. Guilherme, & A. Aleixo. 2013. A New species of *Hemitriccus* tody-tyrant from the state of Acre, Brazil. *In* Handbook of Birds of the World, special volume: new species and global index (del Hoyo, J., A. Elliot, J. Sargatal, and D. Christie, eds.): pp. 292-296. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.